

PARAVASATE-SET

Liste 3: substanzspezifische Maßnahmen

+ Hyaluronidase s.c./trockene Wärme

Hyaluronidase:

betroffene Stelle in Abhängigkeit von der Größe des Paravasates mit bis zu 1500 IE Hyaluronidase s.c. umspritzen, lokale Analgesie!

unmittelbar anschließend trockene Wärme:

subjektiv als angenehm empfundene trockene Wärmeanwendung (z.B. Cold-Hot Pack, Wärmflasche) 4 x täglich über 20 Minuten

+ DMSO topisch/trockene Kälte

DMSO:

1. 99%ige DMSO-Lösung alle 8 Stunden steril (z.B. mit sterilem Kugeltupfer) ohne Druck auftragen
2. an der Luft trocknen lassen – **Cave!** nicht abdecken!
3. Anwendung über mindestens 7 Tage

unmittelbar anschließend trockene Kälte:

1. initial mindestens 1 Stunde kühlen (z.B. mit Cold-Hot Pack)
2. weiterführend mehrmals täglich über jeweils 15 Minuten kühlen

bei Paravasaten aller Zytostatika

- Cave!**
1. keine Spülungen des i.v. Zuganges
 2. keine feuchten Umschläge
 3. keine Alkoholumschläge
 4. keine Okklusionsverbände